



REGIONE VENETO - U.L.S.S. n.10 " VENETO ORIENTALE "  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO ( VE )  
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA  
DIRETTORE : dr. CELIO LAZZARINI  
TELEFONO: 0421.764511

---

Lì 25-11-2016 [redacted] 1 / 1  
Diuresi 24h in mL: Nata 18-08-1925  
M. Rich.: SONZIN MARIA VIA [redacted]  
N. 68487268 del 25-11-2016 PORTOGRUARO CSAP

Gentile Signore/Signora, desideriamo renderLa partecpe che il Servizio Sanitario Regionale ha impiegato euro 27,60 per il Suo percorso di cura.

---

PC-TEMPO DI PROTROMBINA

Attivita' : 44 % [70 - 120]  
INR : 1.92 [0.90 - 1.15]

INTERVALLI DI RIFERIMENTO IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE

In corso di terapia con anticoagulanti orali è indicato mantenere il valore di INR tra 2 e 3 per la prevenzione delle tromboembolie venose, in presenza di fibrillazione atriale o di protesi valvolari biologiche.

Le protesi valvolari meccaniche o la terapia dopo una tromboembolia arteriosa possono giustificare livelli di INR maggiori, con limiti indicativi tra 3 e 4, salvo diversa indicazione dello specialista.